

O RATO É UMA AMEAÇA À SAÚDE DE SUA FAMÍLIA

Sua colaboração é indispensável para combatê-los!

COMO EVITAR RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS

- Guarde os alimentos em vasilhames vedados, de vidro ou metal, preferencialmente, evitando a armazenagem em caixas de papelão ou sacos de pano, plástico ou papel.
- Mantenha os imóveis sempre limpos, seja escritório, escola, creche, hospital, cinema, restaurante, lanchonete e outros. Remova e acondicione corretamente os restos de alimentos e o lixo.
- Se possui animais de estimação (cães, gatos, etc.), recolha as sobras de alimentos antes do anoitecer. Nunca deixe o alpiste dos pássaros espalhados pelo chão. Guarde a ração estocada sempre fechada.
- Retire materiais de construção, restos de obras e tudo o mais que possa ficar amontoado junto a paredes e muros.
- Recolha sobras de alimentos e lixo em sacos plásticos. Feche os sacos e coloque-os em recipientes tampados, de metal ou plástico resistente, até a hora da coleta.
- Não jogue lixo na rua, em terrenos baldios, encostas, fundo de quintais ou margens de rios.
- Vede os vãos de portas, janelas, forros e telhados, e lacre completamente caixas d'água e de gordura, caixas de passagem e de esgoto, fossas e sumidouros.
- Evite guardar pneus usados, móveis, ferro-velho e entulhos, pois materiais amontoados se transformam em locais de abrigo para roedores.



CONHEÇA OS PRINCIPAIS HÁBITOS DOS ROEDORES

Ratos de telhado, ratazanas e camundongos são encontrados em locais que ofereçam acesso, abrigo, alimento e água.


As ratazanas cavam ninheiras (tocas) em áreas de terra - quintais e jardins, ou de areia, como a orla das praias. Vivem também em garagens, porões, galerias de esgoto e de águas pluviais.

Os ratos pretos, ou de telhado, preferem forros, sótãos, árvores e abrigos nas partes altas das casas e galpões.

Os camundongos habitam o interior das residências, fazendo seus ninhos em estufas de fogões, gavetas, armários, forração de sofás, poltronas, despensas e compartimentos de pouco uso.



ratazana



rato de telhado



camundongo

RATOS TRANSMITEM A LEPTOSPIROSE

Os ratos são os principais transmissores da leptospirose, doença grave causada pela bactéria *Leptospira*. Eles eliminam a bactéria através da urina, contaminando córregos, bueiros, esgotos ou água acumulada nos quintais das casas, onde exista infestação por roedores.

Em época de chuvas fortes, a água das enchentes e a lama são as principais fontes de contaminação.

O homem adquire a doença, principalmente, através da pele e mucosas nasal, ocular, do ânus e das partes genitais. Se ele tiver alguma ferida ou arranhão, ao entrar em contato com as águas ou a lama de enchentes, pode se contaminar mais facilmente. A contaminação pode ocorrer mesmo com a pele sem machucados.

LEMBRE-SE: Se você teve contato com água suja, lama ou esgoto, procure um médico e relate o ocorrido, assim que aparecerem os primeiros sinais de doença, pois o tratamento imediato evita complicações.

SINTOMAS DA LEPTOSPIROSE

- Febre
- Calafrios
- Dores musculares, principalmente nas panturrilhas (barriga das pernas)
- Dor de cabeça; mal estar; náuseas; vômitos
- Dor nos olhos, provocada pela luz
- Insuficiência renal
- Hemorragia ou icterícia nas córneas, mucosas e pele

Os sintomas surgem, normalmente, de três a treze dias após o contato com a bactéria. A doença pode durar apenas alguns dias ou, até, três semanas.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período de incubação da leptospirose varia, de pessoa para pessoa, entre 1 e 20 dias. Em média, situa-se entre 8 a 10 dias.


COMBATA OS RATOS

A melhor forma de combate é a prevenção. Água acumulada, lixo e roedores facilitam a ocorrência de leptospirose.

O risco é maior para pessoas que moram em locais sem saneamento básico e em condições precárias de higiene.

Em áreas urbanas, os indivíduos mais expostos são aqueles que trabalham ou vivem em áreas sujeitas a enchentes.

ameaça à saúde de sua família



Mantenha as garagens, o quintal e os sótãos limpos e arrumados.

Mantenha aparada a vegetação próxima à sua residência, para evitar a penetração de roedores.

Tampe qualquer possível entrada de ratos, inclusive as saídas de esgoto.

Só limpe caixas de gordura, fossas e ambientes contaminados com o auxílio de material de proteção.

A água das enchentes pode causar outras doenças graves além da leptospirose. Dentre elas: a febre tifóide, a hepatite e a cólera.

Obtenha mais informações na Gerência de
Controle de Roedores
Rua Rio Grande do Sul, 26 Méier RJ
Telefax : 2218-4606



**Lugar de lixo é na lixeira.
Uma questão de educação.**

