

## PROVA DE SELEÇÃO À RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O ANO DE 2023 ANOS OPCIONAIS

### **CIRURGIA GERAL - CIRURGIA DO TRAUMA CIRURGIA GERAL - CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA COM PRÉ-REQUISITOS**

01. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
02. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
03. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

#### CONTEÚDO

#### NÚMERO DE QUESTÕES

CIRURGIA GERAL

40

04. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

**"Amor é um fogo que arde sem se ver"**

05. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
06. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
07. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador etc., **SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.**
08. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independentemente, do início da prova:
  - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc. salvo se autorizado, previamente pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;
  - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
  - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
  - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
09. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546/2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.**
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no site <http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos>.



## CIRURGIA GERAL

01. A causa mais comum de hemorragia digestiva originada do intestino delgado é:
- neoplasia
  - angiodisplasias
  - divertículo de Meckel
  - doença de Crohn
02. Um paciente, ao ser submetido a endoscopia digestiva alta, é diagnosticado com uma úlcera gástrica sem sangramento com coágulo aderido ao seu fundo. Considerando a classificação de Forrest sobre sangramento de úlceras pépticas, a referida pode ser classificada com Forrest:
- III
  - Ia
  - Ib
  - Ic
03. A técnica de funduplicatura parcial, que consiste em fazer uma válvula no esôfago distal de 270 graus, é conhecida com funduplicatura à:
- Toupet
  - Nissen
  - Kocher
  - Rioland
04. A patologia herniária mais comum em mulheres, que gera o abdome agudo obstrutivo por encarceramento, é a hérnia:
- inguinal
  - femoral
  - umbilical
  - de Spiegel
05. O microorganismo que mais frequentemente causa a infecção grave pós esplenectomia é:
- Salmonella spp
  - N. meningitidis*
  - S. pneumoniae*
  - H. influenzae*
06. Sobre a distribuição linfonodal regional do tórax, a ressecção dos linfonodos da estação do ligamento pulmonar significa que foi feita a linfadenectomia da cadeia de número:
- 5
  - 7
  - 9
  - 11
07. É causa de derrame pleural por exudato:
- insuficiência cardíaca congestiva
  - síndrome nefrótica
  - cirrose hepática
  - linfoma
08. A tríade de Beck é formada pelos seguintes sintomas: hipotensão arterial, turgescência de jugular e:
- hipofonese de bulhas cardíacas
  - hiperfonese de bulhas cardíacas
  - hipertimpanismo no hemitórax direito
  - hipotimpanismo no hemitórax direito
09. Paciente feminino, 22 anos de idade, foi vítima de acidente automobilístico. É admitida no setor de emergência, apresentando abertura ocular ao chamado de voz, resposta verbal confusa e localização de dor, quando estimulada. Segundo pontuação da escala de coma de Glasgow, este paciente possui a classificação igual a:
- 14
  - 12
  - 10
  - 8
10. Gestante de 33 anos de idade foi vítima de acidente automobilístico. Recebida no setor de emergência, apresentando taquicardia, hipotensão arterial e ferimento profundo no membro inferior direito. É esperado que ela tenha uma perda sanguínea de, aproximadamente, do seu volume total:
- 5%
  - 10%
  - 20%
  - 30%
11. Marcador tumoral, que se apresenta com seu nível sérico aumentado em mulheres jovens portadoras de endometriose profunda, é:
- CEA
  - CA 125
  - CA 19-9
  - Alfa feto proteína
12. A artéria ileocólica tem como ramo a artéria:
- retal
  - apendicular
  - sigmoideana
  - cólica esquerda
13. O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do intestino delgado. Geralmente é assintomáticos. No entanto, quando se manifesta clinicamente, na maioria das vezes ocorre por meio de:
- massa palpável
  - inflamação
  - hemorragia
  - obstrução
14. Entre os avanços relacionados à cirurgia bariátrica e metabólica, podemos citar a melhor compreensão dos efeitos dos hormônios gastrointestinais. Em relação à grelina, é correto afirmar que:
- é produzida preferencialmente no íleo terminal e age sobre o pâncreas aumentando a produção de insulina
  - é produzida preferencialmente no íleo terminal e tem função incretínica
  - é produzida preferencialmente no estômago e tem ação anorexígena
  - é produzida preferencialmente no estômago e tem ação orexígena
15. A fratura do escafoide é a mais comum entre as fraturas dos ossos do carpo. Qual das complicações abaixo relacionadas a esse tipo de fratura é a mais comum:
- perda da mobilidade do polegar
  - desinserção do tendão
  - dedo em gatilho
  - necrose

16. O uso da radiação ionizante é uma preocupação na utilização de exames de imagem em pacientes grávidas. Considerando apenas a exposição fetal à radiação, qual dos exames abaixo seria o mais seguro:
- ressonância nuclear magnética da pelve
  - tomografia computadorizada do tórax
  - radiografia simples do abdome
  - mamografia
17. A resposta metabólica ao estresse cirúrgico leva à produção aumentada de diversos hormônios. Entretanto, alguns hormônios podem ter sua produção até mesmo diminuída, como por exemplo:
- o cortisol
  - a insulina
  - corticotropina
  - a aldosterona
18. A realização de anastomose biliodigestiva, para tratamento da doença litíásica das vias biliares, requer do cirurgião conhecimento acerca de detalhes técnicos importantes para a correta escolha e execução do procedimento mais adequado. Dessa forma, podemos afirmar que:
- a possibilidade de acesso futuro por endoscopia é uma das vantagens da técnica de coledocojejunoanastomose em Y de Roux
  - a ocorrência de *sump syndrome* está associada às coledocoduodenostomias e não às coledocojejunoanastomoses em Y de Roux
  - a presença de um cálculo impactado na ampola de Vater contraindica a realização de esfinterotomia transduodenal.
  - a incisão do colédoco deve ser preferencialmente em sentido transversal
19. De acordo com a classificação de choque hemorrágico proposta pelo ATLS, é correto afirmar que:
- a queda da pressão arterial só ocorre a partir do choque Classe III, quando há perda de 30 a 40% da volemia
  - a queda da pressão arterial só ocorre a partir do choque Classe IV, quando há perda de 30 a 40% da volemia
  - alterações do sistema nervoso central, que vão desde uma pequena ansiedade até a letargia, só ocorrem a partir da Classe III de choque
  - alterações do sistema nervoso central, que vão desde uma pequena ansiedade até a letargia, só ocorrem a partir da Classe IV de choque
20. Considerando os modernos conceitos de segmentação hepática propostos por Couinaud, qual segmento é suprido pela ramificação medial da veia porta esquerda:
- II
  - III
  - IV
  - V
21. De acordo com a classificação de Nyhus, a hérnia inguinal pediátrica é classificada como sendo do tipo:
- 1
  - 2
  - 3
  - 4
22. Em relação à anatomia da parede abdominal, é correto afirmar que:
- o retorno venoso se faz pelo sistema porta
  - a artéria epigástrica inferior é ramo da artéria femoral
  - o músculo transversal é o maior músculo da parede abdominal
  - o triângulo de Hesselbach é limitado inferiormente pelo ligamento inguinal
23. Dez dias após à realização de apendicectomia em decorrência de quadro de apendicite aguda, o exame histopatológico revelou a presença de tumor carcinóide de 0,8 cm localizado na ponta do apêndice. A conduta preferencial deverá ser:
- observação
  - hemicolectomia direita
  - quimioterapia com gemcitabina
  - quimioterapia com 5-Fluorouracil
24. Dentre as cirurgias bariátricas abaixo, qual é considerada predominantemente disabsortiva:
- gastrectomia vertical
  - banda gástrica ajustável
  - derivação biliopancreática
  - bypass gástrico em Y de Roux
25. Enunciado: Em relação às novas fontes de energia, é correto afirmar:
- o bisturi harmônico produz calor pela alta frequência de vibração
  - o bisturi de argônio funciona pela criação de um circuito de energia bipolar que conduz o gás até os tecidos.
  - os lasers são formas modernas de aplicação de energia convertida de uma mistura de gases, gerando fotocoagulação
  - a ablação por micro-ondas ou radiocirurgia, pelas características dos equipamentos disponíveis, só está à disposição para utilização durante laparotomias
26. O conhecimento das características dos fios cirúrgicos é essencial para a realização de boa técnica. Qual dos fios cirúrgicos abaixo é multifilamentar:
- polidioxanona
  - poliglecaprone
  - polipropileno
  - poliglactina
27. Paciente branco, 58 anos, deu entrada na emergência com quadro de priapismo, com evolução de cerca de 6 horas após utilização de drogas para disfunção erétil. A conduta inicial mais adequada deverá ser:
- compressão do períneo
  - analgesia venosa e aplicação de gelo
  - tratamento cirúrgico para shunt arteriovenoso
  - aspiração e irrigação dos corpos cavernosos, com agulha
28. A principal causa de abdome agudo na gestante é:
- colite
  - colecistite
  - apendicite
  - diverticulite

29. Paciente de 60 anos com quadro de diverticute complicada Hinchey IV deve ser tratado com:
- (A) cirurgia
  - (B) drenagem percutânea
  - (C) drenagem por colonoscopia
  - (D) antibiótico terapia sistêmica isolada
30. O tratamento agudo do volvo de sigmoide deve ser realizado com:
- (A) colonpexia
  - (B) colonoscopia
  - (C) colectomia com colostomia
  - (D) colectomia sem colostomia
31. O órgão mais comumente afetado com metástase do adenocarcinoma de cólon é:
- (A) baço
  - (B) fígado
  - (C) pulmão
  - (D) cérebro
32. A infecção pelo HPV está associada ao seguinte tumor:
- (A) GIST
  - (B) linfoma de reto
  - (C) denocarcinoma de reto
  - (D) carcinoma epidermoide de canal anal
33. O tratamento da hemorragia digestiva alta de origem varicosa esofageana é melhor controlado com:
- (A) esplenectomia
  - (B) ligadura elástica
  - (C) anastomose porto cava calibrada
  - (D) uso de betabloqueador
34. A manobra de Mattox é utilizada na seguinte situação:
- (A) TCE
  - (B) trauma abdominal
  - (C) acesso venoso profundo
  - (D) dificuldade de entubação
35. O uso do curativo VAC tem sua indicação de urgência na seguinte patologia:
- (A) TCE
  - (B) trauma testicular
  - (C) mediastinite pós trauma penetrante
  - (D) síndrome do compartimento abdominal
36. A cirurgia de Duhamel-Haddad é realizada para o tratamento da seguinte patologia:
- (A) retocolite ulcerativa
  - (B) endometriose profunda
  - (C) megacólon chagásico
  - (D) diverticulite de Meck
37. A videolaparoscopia no tratamento do trauma abdominal é contraindicada na presença de:
- (A) instabilidade hemodinâmica
  - (B) lesão toracoabdominal
  - (C) perfuração intestinal
  - (D) fratura de bacia
38. O medicamento utilizado para o tratamento do sangramento digestivo alto por varizes esofageanas é:
- (A) AAS
  - (B) Octreotide
  - (C) Propanolol
  - (D) Vassopressina
39. O tumor maligno mais comum da glândula tireoide é:
- (A) adenocarcinoma
  - (B) células claras
  - (C) papilífero
  - (D) folicular
40. O marcador tumoral frequentemente elevado em pacientes jovens portadoras de endometriose profunda multicompartmental é:
- (A) Alfa-fetoproteína
  - (B) CEA
  - (C) CA 19-9
  - (D) CA 125