

**PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
UNIDADES HOSPITALARES E MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
PARA O ANO DE 2023**

CIRURGIA VASCULAR - VAGAS OCIOSAS

01. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
02. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
03. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

Conteúdo	Nº de questões
Cirurgia Geral	60

04. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

"As coisas simples são as mais extraordinárias."

05. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
06. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
07. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador etc., **SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.**
08. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independentemente, do início da prova:
 - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc. salvo se autorizado, previamente pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;
 - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
 - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
 - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
09. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546/2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta** devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no site <http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos>.

**PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
UNIDADES HOSPITALARES E MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
PARA O ANO DE 2023**

UROLOGIA - VAGAS OCIOSAS

01. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
02. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
03. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

Conteúdo	Nº de questões
Cirurgia Geral	60

04. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico.

"As coisas simples são as mais extraordinárias."

05. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
06. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
07. O candidato cujo aparelho celular ou outro equipamento, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador etc., **SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.**
08. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independentemente, do início da prova:
- a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc. salvo se autorizado, previamente pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no edital regulamentador do certame;
 - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
 - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
 - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
09. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais ou emitam sons e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
10. Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546/2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta** devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. **O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.**
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível também, no site <http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos>.

CIRURGIA GERAL

01. O tratamento cirúrgico de escolha para a resolução da Síndrome de Wilkie é:
- (A) colostomia à Hartmann
 - (B) duodenojejunostomia
 - (C) esofagojejunostomia
 - (D) gastroenterostomia
02. A bactéria anaeróbica mais comumente isolada em uma apendicite aguda é:
- (A) *Pseudomonas aeruginosa*
 - (B) *Bilophila wadsworthia*
 - (C) *Bacteriodes fragilis*
 - (D) *Escherichia coli*
03. A artéria apendicular normalmente é ramo da artéria:
- (A) mesentérica inferior
 - (B) cólica direita
 - (C) cólica média
 - (D) ileocólica
04. Durante o exame físico em um paciente com suspeita diagnóstica de apendicite aguda, a palpação do quadrante inferior esquerdo do abdome gera dor no quadrante inferior direito. Esse sinal é conhecido como sinal de:
- (A) Lennander
 - (B) McBurney
 - (C) Rovsing
 - (D) Psoas
05. A veia porta é formada normalmente pela confluência das veias:
- (A) mesentérica superior e mesentérica inferior
 - (B) mesentérica inferior e cólica média
 - (C) mesentérica superior e esplênica
 - (D) esplênica e gastroepiplóica
06. A principal causa de abdome agudo em mulheres grávidas é:
- (A) diverticulite
 - (B) apendicite
 - (C) colecistite
 - (D) colite
07. A ocorrência de dor no quadrante superior direito do abdome, febre e icterícia é conhecida como Tríade de:
- (A) Reynolds
 - (B) Charcot
 - (C) Mirizzi
 - (D) Budd
08. Dentre as técnicas cirúrgicas para o tratamento das hérnias inguinais descritas abaixo, aquela que utiliza tela cirúrgica é a técnica de:
- (A) Shouldice
 - (B) McVay
 - (C) Stoppa
 - (D) Basini
09. O ligamento pectíneo é conhecido como ligamento de:
- (A) Cooper
 - (B) Poupart
 - (C) Richter
 - (D) Rives
10. A veia adrenal direita comumente drena para a veia:
- (A) mesentérica superior
 - (B) mesentérica inferior
 - (C) cava inferior
 - (D) renal direita
11. O tratamento cirúrgico da obesidade que apresenta somente componente restritivo é:
- (A) gastrectomia em manga (Sleeve gastrectomy)
 - (B) by-pass gástrico em "Y" de Roux
 - (C) derivação biliopancreática
 - (D) switch duodenal
12. Uma paciente apresentando índice de massa corporal igual a 41 kg/m^2 é classificada como portadora de:
- (A) obesidade grau 1
 - (B) obesidade grau 2
 - (C) obesidade grau 3
 - (D) sobrepeso
13. Um paciente de 80 kg de peso é levado ao atendimento de emergência com 50% da superfície corporal com queimaduras de 2º e 3º graus. Levado em consideração a fórmula de Parkland para instituir a hidratação venosa, esse paciente deve receber, deringer com lactato, nas primeiras 8 horas de internação:
- (A) 8.000 ml
 - (B) 10.000 ml
 - (C) 14.000 ml
 - (D) 16.000 ml
14. O divertículo de Meckel é encontrado no:
- (A) cólon transversal
 - (B) duodeno
 - (C) jejuno
 - (D) íleo

15. Em um paciente com quadro de diverticulite complicada classificada como Hinchey estágio 3 é encontrado o seguinte quadro:
- (A) pequeno abscesso pericolônico
 - (B) peritonite purulenta
 - (C) abscesso pélvico
 - (D) peritonite fecal
16. Além de pancreatite aguda a amilase pode estar aumentada na ocorrência da seguinte patologia:
- (A) doença pulmonar obstrutiva crônica
 - (B) doença ulcerosa péptica
 - (C) insuficiência cardíaca
 - (D) miomatose uterina
17. O triângulo anatômico que possui como lados o ligamento de Poupart, os vasos epigástricos inferiores e a borda lateral do músculo reto abdominal é o triângulo de:
- (A) Hasselbach
 - (B) Killian
 - (C) Callot
 - (D) Petit
18. O fio absorvível é descrito na alternativa:
- (A) polidioxanona
 - (B) polipropileno
 - (C) mononylon
 - (D) aço
19. A realização de colonoscopia está contra indicada na ocorrência de:
- (A) síndrome de Ogilvie
 - (B) volvo de sigmóide
 - (C) diverticulite aguda
 - (D) retite actínica
20. Um nódulo único hiperfuncionante de tireóide gerando hipertireoidismo é conhecido como doença de :
- (A) Graves
 - (B) Kocher
 - (C) Hashimoto
 - (D) Plummer
21. O risco de deficiência de cianocobalamina em um paciente submetido a "By pass" gástrico em "Y" de Roux para o tratamento da obesidade ocorre durante:
- (A) de 3 a 6 meses de pós-operatório
 - (B) de 6 a 12 meses de pós-operatório
 - (C) de 1 ano a 2 anos de pós-operatório
 - (D) o restante de sua vida
22. No choque hemorrágico, a pressão arterial está diminuída a partir da classe:
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
23. O melhor tipo de estudo para avaliar a diferença de recidiva entre duas técnicas de correção de hérnias inguinais é:
- (A) ensaio clínico randomizado
 - (B) estudo de caso-controle
 - (C) experiência do cirurgião
 - (D) estudo de Coorte
24. Em relação a vascularização renal é correto afirmar que:
- (A) as artérias renais são normalmente ramos da aorta
 - (B) a veia renal esquerda é normalmente mais curta que a direita
 - (C) as veias renais normalmente drenam para as veias hipogástricas ipsilaterais
 - (D) as artérias renais estão normalmente localizadas anteriormente e abaixo das veias renais
25. Normalmente estão presentes no tamponamento cardíaco:
- (A) hipertensão arterial, turgência das veias jugulares e hipofonese de bulhas
 - (B) hipertensão arterial, veias jugulares colabadas e hipofonese de bulhas
 - (C) hipotensão arterial, veias jugulares colabadas e hipofonese de bulhas
 - (D) hipotensão arterial, turgência das veias jugulares e hipofonese de bulhas
26. Em relação as mordidas e picadas é correto afirmar que:
- (A) a administração de soro antiofídico nas mordidas de cobra é tempo-sensível, ou seja, quanto mais cedo for administrado, mais eficaz é a terapia
 - (B) as mordidas de mamíferos são responsáveis por mais mortes anuais que as picadas de insetos
 - (C) nas mordidas de cobra, a fasciotomia do membro acometido é habitualmente indicada
 - (D) mordedura de cães é a principal fonte de transmissão da raiva
27. Em relação as técnicas bariátricas, é correto afirmar:
- (A) nenhuma das técnicas regulamentadas inclui a realização de uma gastrectomia
 - (B) a reconstrução em Y de Roux não faz parte de nenhuma das técnicas disponíveis
 - (C) a gastrojejunostomia do by-pass gástrico é sempre realizada com grampeador cirúrgico
 - (D) o sentido da gastrectomia (vertical x horizontal) é uma das diferenças entre as técnicas de derivação biliopancreática

28. O carcinoma de células escamosas é o tipo histológico mais comum nos tumores:
- (A) do esôfago distal
 - (B) do canal anal
 - (C) do apêndice
 - (D) do estômago
29. É o divertículo esofágico mais comum:
- (A) Meckel
 - (B) Epifrênico
 - (C) Medioesofágico
 - (D) Zenker
30. Em relação a atresia do esôfago é correto afirmar:
- (A) a forma mais comum está associada a presença de fistula traqueoesofágica distal
 - (B) não é frequente que ocorram outras anomalias congênicas associadas
 - (C) o diagnóstico ocorre normalmente após um ano de vida
 - (D) há clara predominância no sexo feminino
31. É a principal causa de obstrução intestinal alta:
- (A) hernia
 - (B) brida
 - (C) tumores
 - (D) intussuscepção
32. Em relação à inervação dos músculos intrínsecos da mão, aquele que tem a função relacionada ao nervo mediano é o:
- (A) adutor do polegar
 - (B) flexor do dedo mínimo
 - (C) abdutor do dedo mínimo
 - (D) flexor curto do polegar
33. De acordo com a classificação de Nyhus para as hérnias inguinais, a hérnia pediátrica é do tipo:
- (A) IV
 - (B) III
 - (C) II
 - (D) I
34. A presença de um tumor na parede abdominal em paciente portador de polipose adenomatosa familiar sugere tratar-se de:
- (A) adenocarcinoma
 - (B) tumor desmoide
 - (C) sarcoma
 - (D) metástase
35. A técnica de Puestow é utilizada para tratamento da patologia:
- (A) tumor primário do fígado
 - (B) pancreatite crônica
 - (C) atresia biliar
 - (D) coledocolitíase
36. Durante avaliação pré-operatória um paciente apresenta os seguintes resultados de provas sorológicas: HBsAg negativo e Anti-HBs positivo. Devemos interpretar esse resultado da seguinte forma:
- (A) não é possível nenhuma conclusão somente com esses dois exames
 - (B) paciente portador de hepatite em fase aguda
 - (C) paciente portador de hepatite crônica ativa
 - (D) paciente tem imunidade a hepatite B
37. Durante avaliação radiológica de um paciente com dor abdominal aguda observou-se a presença de um pneumoperitônio. A conduta imediata deverá ser:
- (A) tratamento cirúrgico
 - (B) endoscopia digestiva alta
 - (C) endoscopia digestiva baixa
 - (D) repetir o exame de imagem com uso de bário
38. A cicatrização das feridas normalmente acontece em 3 fases: inflamação, proliferação e maturação. As células predominantes durante a fase proliferativa são:
- (A) neutrófilos
 - (B) macrófagos
 - (C) fibroblastos
 - (D) linfócitos
39. É a principal indicação para transplante de fígado no adulto:
- (A) cirrose hepática não colestática
 - (B) carcinoma hepatocelular
 - (C) hepatite aguda
 - (D) atresia biliar
40. O marcador tumoral frequentemente elevado em pacientes jovens com endometriose profunda é:
- (A) CEA
 - (B) CA 19-9
 - (C) CA 125
 - (D) Alfa-feto proteína
41. A neoplasia maligna mais comum da tireoide é:
- (A) carcinoma papilar
 - (B) carcinoma folicular
 - (C) carcinoma medular
 - (D) carcinoma anaplásico
42. É a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa:
- (A) neoplasia de reto
 - (B) doença diverticular
 - (C) divertículo de meckel
 - (D) neoplasia de sigmóide

43. Dos procedimentos abaixo, aquele que a ferida cirúrgica pode ser considerada limpa-contaminada é:
- (A) laparotomia para gastrectomia com reconstrução em Y de Roux
 - (B) herniorrafia inguinal
 - (C) sigmoidectomia à Hartman por diverticulite com peritonite
 - (D) ressecção eletiva de cisto sebáceo
44. O ducto colédoco é formado pela junção das seguintes estruturas:
- (A) ducto hepático direito e ducto hepático esquerdo
 - (B) ducto hepático comum e ducto cístico
 - (C) hepático comum e virson
 - (D) virson principal e acessório
45. A gangrena de Fournier acomete a seguinte região corporal:
- (A) glândula de Bartholine
 - (B) membro inferior distal
 - (C) genitália masculina e períneo
 - (D) couro cabeludo
46. O principal câncer diagnosticado nos homens tem origem:
- (A) intestinal
 - (B) pulmonar
 - (C) vesical
 - (D) prostática
47. O exame de endoscopia digestiva alta deve ser utilizado para o diagnóstico e tratamento da seguinte patologia:
- (A) obstrução intestinal alta
 - (B) varizes esofageanas
 - (C) hipertrofia pilórica
 - (D) acalasia
48. A drenagem percutânea guiada por TC é o tratamento de escolha para a seguinte patologia:
- (A) abscesso hepático
 - (B) câncer de próstata
 - (C) hiperplasia prostática benigna
 - (D) diverticulite com peritonite difusa
49. A ressuscitação volêmica de um queimado deve ser calculada nas primeiras 24 horas com a ajuda da fórmula de:
- (A) Hartmann
 - (B) Pitágoras
 - (C) Parkland
 - (D) Morgan
50. A lesão vascular renal provocada por trauma penetrante abdominal é tratada por:
- (A) laparoscopia
 - (B) via endovascular
 - (C) laparotomia mediana
 - (D) conservadoramente em CTI
51. A cirurgia de Vaughan é realizada para o tratamento da lesão traumática:
- (A) vesical
 - (B) gástrica
 - (C) hepática
 - (D) duodenal
52. A síndrome do compartimento abdominal é uma urgência que deve ser tratada com:
- (A) laparotomia e curativo tipo VAC
 - (B) laparoscopia
 - (C) drenagem percutânea
 - (D) hipervolemia
53. A cirurgia de escolha para o tratamento eletivo do megacólon provocado pela Doença de Chagas foi descrita por:
- (A) Hartmann
 - (B) Muller
 - (C) Duhamel-Haddad
 - (D) Miligan
54. O carcinoma epidermoide de canal anal está associado a infecção por:
- (A) COVID
 - (B) Herpes
 - (C) HPV
 - (D) HIV
55. A metástase do adenocarcinoma de sigmóide será para o seguinte órgão:
- (A) baço
 - (B) fígado
 - (C) pulmão
 - (D) cérebro
56. A colonoscopia é um exame que em caráter de urgência deve ser utilizada para o tratamento da seguinte patologia:
- (A) endometriose intestinal
 - (B) volvo de sigmóide
 - (C) apendicetomia
 - (D) diverticulite
57. Paciente de 60 anos de idade com quadro de diverticulite complicada Hinchey I deve ser tratado:
- (A) laparotomia
 - (B) drenagem percutânea
 - (C) drenagem por colonoscopia
 - (D) conservadoramente com antibióticos e analgésicos

58. A artéria gástrica direita e esquerda são responsáveis pela irrigação:

- (A) da pequena curvatura gástrica
- (B) da grande curvatura gástrica
- (C) do fundo gástrico
- (D) do piloro

59. O insulinoma pancreático deve ser tratado com:

- (A) radioterapia
- (B) transplante
- (C) cirurgia
- (D) quimioterapia

60. Dos anestésicos locais abaixo, aquele que tem maior duração de ação é:

- (A) lidocaína
- (B) bupivacaína
- (C) mepivacaína
- (D) cloroprocaína