


Sistema da Lagoa Rodrigo de Freitas



- Monitoramento Pontual: Pontos LRF1, LRF2, LRF3, LRF4, LRF5 e LRF6 (2 vezes por semana);
- Monitoramento Contínuo: Ponto LRF3;
- Pontos de deságue (1-56);

Nível da Lagoa (cm)



Manejo das Comportas e Produção Pesqueira

Jardim de Alah - 29/07 - Aberta - sem fluxo predominante
30/07 - Aberta - vazando

Visc. Albuquerque - Fechada

General Garzon - Fechada

Produção Pesqueira (kg) - 525

Cenários do Plano de Contingência

CENÁRIO 1 - Lançamento de efluente reativo na presença de Reagente de Nessler.

Lançamento de efluentes reativos ao Reagente de Nessler

| Data | Pontos Observados | |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| | Lagoa | Canais |
| QUI (26) | 2, 20 (manhã) | 28, 29, 30 (manhã) |
| SEX (27) | 2 (manhã) | 29, 30 (manhã) |
| SAB (28) | - | - |
| DOM (29) | - | - |
| SEG (30) | Vistoria ainda ã realizada | Vistoria ainda ã realizada |

* O Reativo de Nessler identifica a presença de amônia. Teste qualitativo.

Condições Meteorológicas


Temperatura do ar - mínima de 19,5 °C e máxima de 26,7 °C.

Pluviosidade - acumulado de 0,0 mm.

Radiação solar - máxima de 791,0 watt/m² às 11:30h.

Ventos - Fracos e predominantemente de NO (noroeste).

Diagnóstico da Qualidade da Água



Divisão conforme Decreto Municipal 18.415, de 01/03/2000.

Recreação de contato secundário (Resolução CONAMA 357/2005)

- Área 1: Própria
- Área 2: Própria
- Área 3: Imprópria

Proteção das comunidades aquáticas:

- ▲ Estado de equilíbrio
 - ▲ Estado de alerta
 - ▲ Estado crítico
- Cenários de contingência:
- ▲ Até 1 Cenário
 - ▲ Com 2 Cenários
 - ▲ Com 3 ou + Cenários

Proteção das Comunidades Aquáticas



Classificação: Bandeira Verde (Estado de Equilíbrio), baseada nos valores de Oxigênio Dissolvido (mg/L):

Equilíbrio - OD ≥ 4mg/L | Alerta - 2 ≤ OD < 4 (mg/L) | Crítico - OD < 2mg/L

Contato Secundário

Classificação: As Áreas 1 e 2 encontram-se Próprias e a Área 3 encontra-se Imprópria para o contato secundário, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, para água salobra Classe 2.

Resultados do Monitoramento Contínuo



Comunidade Fitoplanctônica - coleta em 25/07/12

Densidade Média de 449 mil ind./mL.

Varição Redução de 15% na densidade total em relação à coleta de 23/07/12.

Dominância Não houve dominância de espécie e predominância de 67% do grupo cianobactéria.

