


## CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – CRIANÇA

| Idade        | Vacina                                                                                                                                                                                 | História vacinal | Esquema/<br>Dose indicada | Idade máxima                   | Local de<br>aplicação |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ao<br>nascer | <b>BCG (atenuada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Formas graves da Tuberculose                                                                                                         | -                | Dose única                | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias | DD                    |
|              | <b>Hepatite B (recombinante)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Hepatite B                                                                                                                | -                | Dose inicial              | Até 30 dias de vida            | VLD                   |
| 2 meses      | <b>Pentavalente - DTP/Hep B/Hib (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae b</i> | -                | 1ª dose                   | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias | VLE                   |
|              | <b>Poliomielite (VIP) (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Poliomielite ou Paralisia Infantil                                                                                   | -                | 1ª dose                   | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias | VLD distal            |
|              | <b>Pneumocócica 10 valente (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo                                           | -                | 1ª dose                   | Até 11 meses e 29 dias         | VLD proximal          |
|              | <b>Rotavírus (atenuada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Diarreia por Rotavírus                                                                                                         | -                | 1ª dose                   | Até 3 meses e 15 dias          | ORAL                  |
| 3 meses      | <b>Meningocócica C (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C                                                    | -                | 1ª dose                   | Até 11 meses e 29 dias         | VLE                   |
| 4 meses      | <b>Pentavalente - DTP/Hep B/Hib (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae b</i> | -                | 2ª dose                   | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias | VLE                   |
|              | <b>Poliomielite (VIP) (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Poliomielite ou Paralisia Infantil                                                                                   | -                | 2ª dose                   | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias | VLD distal            |
|              | <b>Pneumocócica 10 valente (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo                                           | -                | 2ª dose                   | Até 11 meses e 29 dias         | VLD proximal          |
|              | <b>Rotavírus (atenuada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Diarreia por Rotavírus                                                                                                         | -                | 2ª dose                   | Até 7 meses e 29 dias          | ORAL                  |
| 5 meses      | <b>Meningocócica C (inativada)</b><br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C                                                    | -                | 2ª dose                   | Até 11 meses e 29 dias         | VLE                   |



## CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – CRIANÇA

| Idade    | Vacina                                                                                                                                                                                 | História vacinal                       | Esquema/<br>Dose indicada     | Idade máxima                                    | Local de aplicação |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 6 meses  | <b>Pentavalente - DTP/Hep B/Hib</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae b</i> | -                                      | 3ª dose                       | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias                  | VLE                |
|          | <b>Poliomielite (VIP)</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Poliomielite ou Paralisia Infantil                                                                                   | -                                      | 3ª dose                       | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias                  | VLD                |
| 12 meses | <b>Tríplice viral</b> (atenuada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Sarampo, Caxumba e Rubéola                                                                                                | -                                      | 1ª dose                       | Até 9 anos, 11 meses e 29 dias (grupo crianças) | DD                 |
|          | <b>Pneumocócica 10 valente</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo                                           | Com 1 ou 2 doses                       | Reforço                       | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias                  | VLD                |
|          |                                                                                                                                                                                        | Não vacinada                           | Dose única                    |                                                 |                    |
|          | <b>Meningocócica C</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> <i>Neisseria meningitidis</i> do grupo C                                                                                | Com 1 ou 2 doses                       | Reforço                       | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias                  | VLE                |
|          |                                                                                                                                                                                        | Não vacinada                           | Dose única                    |                                                 |                    |
| 15 meses | <b>Tetra Viral</b> (atenuada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela                                                                                         | Com 1 dose de Tríplice viral           | 2ª dose / Dose única varicela | Até 23 meses                                    | DD                 |
|          | <b>Hepatite A</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Hepatite A                                                                                                                   | -                                      | Dose única                    |                                                 | VLD                |
|          | <b>Tríplice bacteriana - DTP</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano e Coqueluche                                                                                 | Com 3 doses de Penta                   | 1º reforço                    | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias                  | VLE                |
|          | <b>Poliomielite (VOPb)</b> (atenuada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Poliomielite ou Paralisia Infantil                                                                                   | Com 3 doses de VIP                     | 1º reforço                    | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias                  | ORAL               |
| 4 anos   | <b>Tríplice bacteriana - DTP</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria, Tétano e Coqueluche                                                                                 | Com 3 doses de Penta + 1 reforço DTP   | 2º reforço                    | Até 6 anos, 11 meses e 29 dias                  | DE                 |
|          | <b>Poliomielite oral (VOPb)</b> (atenuada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Poliomielite ou Paralisia Infantil                                                                              | Com 3 doses de VIP + 1 reforço VOPb    | 2º reforço                    | Até 4 anos, 11 meses e 29 dias                  | ORAL               |
| 9 anos   | <b>HPV quadrivalente</b> (inativada)<br><b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Câncer de cólio de útero                                                                                              | Não vacinada                           | 2 doses (0-6m)                | Até 14 anos (para meninas)                      | DD                 |
|          |                                                                                                                                                                                        | Com 1 dose da vacina HPV quadrivalente | 2ª dose                       |                                                 |                    |