

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Modalidade Demais Estágios: **FISIOTERAPIA**

1. A prova terá duração de 3 (três) horas, considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA.
2. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, a caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
3. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D).
4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no CARTÃO-RESPOSTA, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico. O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da prova e a eliminação no certame:

“A disciplina é a parte mais importante do sucesso” – Truman Capote

5. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato.
6. O telefone celular deverá permanecer desligado e acondicionado em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da prova.
7. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
8. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
9. Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o CARTÃO-RESPOSTA, devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando seu caderno de questões.
10. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no CARTÃO-RESPOSTA.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro de seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
12. **Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.**
13. **O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES .**
14. O gabarito da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. Rio, no segundo dia útil após ao de realização da prova, estando disponível também, no site <http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos>

FISIOTERAPIA

01. Em paciente de grande emergência, a saturação da hemoglobina pode estar alterada na presença de alguns fatores. O fator mais relevante é a ocorrência de:
- (A) perfusão periférica
 - (B) arritmia cardíaca
 - (C) neoplasia
 - (D) trauma
02. No enchimento do ventrículo esquerdo, ocorre a dilatação do ventrículo direito com desvio do septo interventricular, caracterizando uma alteração hemodinâmica chamada de:
- (A) epilepsia
 - (B) bradicardia
 - (C) embolia pulmonar
 - (D) fechamento do *shunt*
03. Achados clássicos na radiografia em que se apresentam alterações como amputação da artéria pulmonar, oligemia e infiltrado em cunha são característicos de:
- (A) atelectasia basal
 - (B) insuficiência cardíaca
 - (C) infarto agudo do miocárdio
 - (D) tromboembolismo pulmonar
04. De acordo com a classificação funcional no grau de movimento articular, a articulação levemente móvel é chamada de:
- (A) sinovial
 - (B) diartrose
 - (C) sinartrose
 - (D) anfiartrose
05. É um exemplo de articulação elipsoide:
- (A) intertarsal
 - (B) radiocarpal
 - (C) intercarpal
 - (D) metacarpal
06. O mesencéfalo está localizado entre duas estruturas, que são chamadas de:
- (A) bulbo e ponte
 - (B) ponte e diencefalo
 - (C) medula espinhal e bulbo
 - (D) tronco encefálico e ponte
07. São células multinucleares que atuam na decomposição e na reabsorção do tecido ósseo:
- (A) osteoclastos
 - (B) osteoblastos
 - (C) endósteos
 - (D) osteócitos
08. Os neurônios que possuem vários dendritos e um axônio são chamados de:
- (A) bipolares
 - (B) unipolares
 - (C) multipolares
 - (D) pseudounipolares
09. A grande maioria das sinapses interneuronais e as neuroefetoras são do seguinte tipo:
- (A) elétrica
 - (B) térmica
 - (C) química
 - (D) retrógrada
10. Os fascículos grácil e cuneiforme, localizados no funículo posterior, têm a seguinte função:
- (A) temperatura
 - (B) tato epicrítico
 - (C) propriocepção
 - (D) tato protopático
11. Na fratura transtrocanteriana ocorre um quadro clínico clássico, em que o membro inferior acometido se apresenta:
- (A) hipotrófico e menor
 - (B) aduzido com flexão
 - (C) maior, com rotação lateral
 - (D) menor, com rotação medial
12. A avaliação da capacidade funcional do idoso requer a análise do grau de independência e autocuidado por meio da escala de:
- (A) Lawton
 - (B) Yesavage
 - (C) Barthel
 - (D) Brody
13. As atividades realizadas em água aquecida a 33°C podem ser benéficas para pacientes com lesões musculoesqueléticas agudas e dolorosas, graças ao efeito de:
- (A) tensão
 - (B) endurance
 - (C) resistência
 - (D) relaxamento
14. O músculo potente de formato retangular, que tem sua origem no arco zigomático com inserção na borda inferior da mandíbula, é o:
- (A) masseter
 - (B) temporal
 - (C) mastoide
 - (D) pterigoide
15. Uma das alterações posturais mais comumente observadas no pescoço, que interfere no funcionamento da ATM (articulação temporomandibular), é:
- (A) flexão
 - (B) inclinação
 - (C) lateralização
 - (D) anteriorização
16. Na avaliação da flexão lateral da coluna lombar, o paciente deve estar posicionado em:
- (A) prono
 - (B) supino
 - (C) ortostatismo
 - (D) agachamento

17. O teste em que se avalia a limitação do tendão supraespinhoso é denominado:
- (A) Hawkins Kennedy
 - (B) Little Leaguer
 - (C) Phalen
 - (D) Speed
18. A síndrome denominada Essex-Lopresti é caracterizada pela luxação da seguinte articulação:
- (A) radiocarpal
 - (B) radioulnar distal
 - (C) radioulnar proximal
 - (D) metacarpofalangeana
19. A flexão do joelho na posição de pronação permite avaliar a tensão no seguinte nervo:
- (A) tibial
 - (B) fibular
 - (C) ciático
 - (D) femural
20. A escala de desenvolvimento infantil, que tem como objetivo detectar atrasos de 1 a 42 meses de idade, é denominada:
- (A) Bobath
 - (B) Denver
 - (C) Bayley
 - (D) Karel
21. No pós-parto imediato, a fisioterapia tem como objetivo:
- (A) melhorar a tonicidade dos músculos abdominais e pélvicos
 - (B) aumentar a diástase do músculo reto do abdome
 - (C) inativar os pontos de gatilho
 - (D) reduzir a tonicidade pélvica
22. Os tópicos que incluem o estudo de carga mental no trabalho, tomada de decisões, desempenho e treinamento referem-se à ergonomia do tipo:
- (A) física
 - (B) cognitiva
 - (C) organizacional
 - (D) por esforço repetitivo
23. O músculo reto do abdome tem sua inervação compreendida entre:
- (A) T6 e T12
 - (B) T7 e T12
 - (C) T8 e T10
 - (D) T9 e T12
24. O sinal do dedo de Sweater é caracterizado pela ruptura do músculo:
- (A) extensor superficial dos dedos
 - (B) flexor profundo dos dedos
 - (C) abdutor do dedo mínimo
 - (D) adutor dos dedos
25. O nervo que surge do fascículo lateral do plexo braquial, cujas fibras derivam do quinto, sexto e sétimo nervos cervicais, e inervam o compartimento anterior do braço, é chamado de:
- (A) ulnar
 - (B) axilar
 - (C) mediano
 - (D) musculocutâneo
26. A fratura da diáfise do rádio com a luxação distal da ulna é chamada de:
- (A) Colles
 - (B) Richard
 - (C) Galeazzi
 - (D) Monteggia
27. As células abundantes do sistema nervoso, caracterizadas por inúmeros prolongamentos e pequena massa citoplasmática ao redor do núcleo, são conhecidas como:
- (A) oligodendróцитs
 - (B) microglíocitos
 - (C) macróglia
 - (D) astrócitos
28. O músculo coracobraquial é responsável pelos seguintes movimentos do membro superior:
- (A) flexão e adução
 - (B) abdução e rotação
 - (C) extensão e rotação
 - (D) extensão e supinação
29. Em relação ao encéfalo, a origem do quinto par de nervo craniano se localiza:
- (A) no sulco bulbopontino
 - (B) entre as bases lateral e posterior do bulbo
 - (C) no sulco medial do pedúnculo cerebral
 - (D) entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio
30. O tipo de massagem que é caracterizada por firme pressão, com vista à mobilização do tecido muscular profundo, e que abrange quatro distintos movimentos é denominada:
- (A) alisamento
 - (B) *pétrissage*
 - (C) tapotagem
 - (D) de Cyriax
31. O tipo de articulação fibrosa que apresenta uma fina camada de tecido conjuntivo e irregular, localizada nos ossos do crânio, é denominada:
- (A) sutura
 - (B) gonfose
 - (C) trocoidea
 - (D) sindesmose
32. O tecido responsável pelo revestimento das superfícies e cavidades corporais, que tem como função proteger, absorver e secretar, é chamado de:
- (A) nervoso
 - (B) epitelial
 - (C) muscular
 - (D) conjuntivo

33. O carpo é formado por 8 ossos distribuídos em duas fileiras transversais. Na fileira superior, encontra-se a seguinte estrutura óssea:
- (A) piramidal
 - (B) trapézio
 - (C) captato
 - (D) hamato
34. Na adeno-hipófise é produzido o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), responsável por regular:
- (A) a atividade da glândula tireoide
 - (B) a contração uterina durante o parto
 - (C) o funcionamento da glândula suprarrenal
 - (D) o controle da ovulação e a produção de progesterona
35. A patologia causada por infecções viróticas sazonais que ocorre no trato respiratório inferior, acometendo criança menores de 2 anos de idade, é:
- (A) asma
 - (B) pneumonia
 - (C) bronquiolite
 - (D) *cor pulmonale*
36. O músculo que é responsável pela flexão lateral do pescoço é o:
- (A) trapézio
 - (B) escaleno
 - (C) espinhal cervical
 - (D) longo cervical

37. Os reflexos avaliados em pacientes pediátricos buscam determinar o nível de desenvolvimento da criança. Quando aplicado contato no calcanhar da criança na posição ereta, obtém-se como resposta uma extensão rígida dos membros inferiores, trata-se do reflexo chamado de:
- (A) suporte positivo
 - (B) preensão plantar
 - (C) tônico cervical simétrico
 - (D) endireitamento do corpo
38. A fim de se avaliar o estado de consciência de um paciente, após ter sofrido um TCE (traumatismo cranioencefálico), é utilizada a escala de:
- (A) Crede
 - (B) Norton
 - (C) Braden
 - (D) Glasgow
39. A lesão anteroinferior de Bankart ocorre na seguinte articulação:
- (A) tibiotársica
 - (B) radiocárpica
 - (C) glenoumeral
 - (D) acromioclavicular
40. Se a quantidade de colágeno aumentar no músculo desnervado, segue-se uma condição conhecida como:
- (A) paralisia
 - (B) tendinite
 - (C) artrose
 - (D) fibrose