



PROCESSO SELETIVO  
2019  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

### Modalidade Demais Estágios: **ODONTOLOGIA (ATENÇÃO INTEGRAL)**

1. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
2. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
3. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, de **conteúdo específico**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D).
4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico:

**"A fé é como o amor: não pode ser obtida pela força."**

5. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.**
6. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
7. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independente do início da prova:
  - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc., salvo se autorizado, previamente, pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no Edital Regulamentador do certame;
  - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
  - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
  - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais, permanecendo sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
9. A simples posse ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, mesmo que desligado, no local da prova, corredor ou banheiros, implicará a exclusão do candidato no certame.
10. Não será permitido ao candidato fumar, conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita** e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível, também, no site <http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos>.

## ODONTOLOGIA – ATENÇÃO INTEGRAL

01. Paciente portador de válvula cardíaca protética procurou a Clínica da Família para tratamento odontológico e, ao exame clínico, o cirurgião-dentista identificou a necessidade de exodontia dos elementos 44 e 45. Face ao risco de endocardite bacteriana, o profissional fez, como profilaxia antibiótica, a prescrição de:
- (A) amoxicilina 3g, 2 horas antes do procedimento e amoxicilina 1,5g, 1 hora depois do procedimento
  - (B) amoxicilina + clavulanato de potássio 875/125 mg, 2 horas antes do procedimento
  - (C) amoxicilina 2g, 1 hora antes do procedimento
  - (D) azitromicina 1,5g, 1 hora antes do procedimento
02. Os procedimentos cirúrgicos, tais como as exodontias, devem seguir alguns princípios básicos de técnica cirúrgica para garantir o sucesso (ou para minimizar complicações pós-operatórias). Considerando esses princípios, pode-se afirmar que:
- (A) para melhor aproximação das bordas cirúrgicas de uma incisão, os tecidos devem ser tracionados e mantidos sob tensão
  - (B) o deslocamento do periósteo deve ser vigoroso para facilitar a vascularização do osso subjacente
  - (C) os fios de sutura utilizados em exodontias devem ser preferencialmente absorvíveis por apresentarem biocompatibilidade com os tecidos
  - (D) bochecho de clorexidina a 0,12%, realizado antes do procedimento cirúrgico, reduz consideravelmente a quantidade de microorganismos do campo operatório
03. Os exames complementares, por vezes, são fundamentais para um diagnóstico mais preciso. Para visualização de cáries interproximais em dentes posteriores, a radiografia mais indicada é a:
- (A) panorâmica
  - (B) oclusal
  - (C) *bitewing*
  - (D) ortopantomográfica
04. As infecções odontogênicas apresentam grande morbidade e são causas frequentes de procura de serviços de urgência. Em relação a essas infecções é correto afirmar que:
- (A) a angina de Ludwig caracteriza-se pelo acometimento bilateral por infecção dos espaços submandibulares, sublingual e submentonianos
  - (B) a pericoronarite está frequentemente associada a terceiros molares semi-inclusos que devem ser extraídos imediatamente
  - (C) no caso de abscesso periapical com área de flutuação e grande quantidade de pus presente, é necessário o uso de antibiótico, drenagem cirúrgica e aplicação de dreno por, pelo menos, 21 dias
  - (D) a maxila está mais propensa à osteomielite que a mandíbula, por ser mais vascularizada, o que facilita a disseminação e propagação das infecções odontogênicas
05. Paciente do sexo masculino, 40 anos de idade, procurou a Clínica da Família para exodontia dos elementos 45 e 46. A respeito das técnicas anestésicas empregadas para exodontia desses elementos, pode-se afirmar que:
- (A) o bloqueio do nervo bucal, a anestesia do nervo mentoniano e a anestesia do nervo lingual são procedimentos alternativos para o bloqueio do nervo alveolar inferior
  - (B) o bloqueio do nervo bucal produzirá efeito anestésico suficiente por todo o lado vestibular
  - (C) o bloqueio do nervo alveolar inferior deve ser complementado pela anestesia do nervo mentoniano para os tecidos moles
  - (D) o bloqueio do nervo alveolar inferior com complemento da anestesia do nervo bucal é suficiente para a realização da técnica cirúrgica
06. A cárie dentária é a doença de maior prevalência e incidência na espécie humana. Em relação a ela, pode-se afirmar que :
- (A) o aumento da resistência à cárie, proporcionada por métodos químicos e mecânicos, torna o dente suficientemente resistente a qualquer tipo de desafio cariogênico a que o indivíduo seja submetido
  - (B) fatores salivares e imunológicos, contagem de microorganismos e fluoroterapia são elementos que interferem no reequilíbrio do fenômeno de desmineralização-rem mineralização (des-re) do esmalte dentário
  - (C) o estreptococo cariogênico é um microorganismo aeróbio facultativo, capaz de produzir ácido lático apenas na fermentação de carboidratos insolúveis, provocando elevação do pH bucal
  - (D) após o exame tátil e visual, o exame radiográfico complementa o diagnóstico da cárie, sendo utilizado para distinguir lesões de cárie ativa ou inativa em sua fase inicial
07. Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, no segundo trimestre de gestação, compareceu à Clínica de Família para realização de um procedimento restaurador, após a fratura de um elemento dentário. De acordo com a situação descrita, o sal anestésico que apresenta mais segurança para a anestesia dessa paciente é:
- (A) articaína
  - (B) mepivacaína
  - (C) lidocaína
  - (D) prilocaína
08. A técnica para a realização de restaurações de resina composta fotopolimerizável exige inúmeros passos, que devem ser seguidos para o sucesso do procedimento. Em relação à fotopolimerização, para se obter a máxima eficácia, o ângulo entre o plano de aplicação da fonte luminosa e a superfície a ser polimerizada mede:
- (A) 30°
  - (B) 45°
  - (C) 60°
  - (D) 90°

09. Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, compareceu à Clínica da Família com queixa de dor espontânea na região inferior direita da face. Ao exame clínico, observou-se lesão cariada no elemento 46 e, quando realizado o teste térmico de sensibilidade a frio no referido elemento, houve exacerbação da dor. Nesse caso, o provável diagnóstico e tratamento proposto são respectivamente:
- (A) pulpíte reversível / pulpotomia
  - (B) pulpíte irreversível / pulpectomia
  - (C) pulpíte irreversível / pulpotomia
  - (D) pulpíte reversível / proteção pulpar direta
10. A hepatite B é uma infecção viral que pode ser transmitida a partir do contato do indivíduo com sangue e/ou secreções corporais contaminados. A principal medida de prevenção contra a hepatite B ocupacional para o cirurgião-dentista é:
- (A) o uso de equipamento de proteção individual no atendimento
  - (B) a realização de bochechos antissépticos antes do atendimento clínico
  - (C) o não compartilhamento de agulhas entre os pacientes
  - (D) a vacinação do profissional pré-exposição contra o vírus HBV
11. O sarampo é uma infecção viral que voltou a ter casos notificados no país após já ter sido erradicada, principalmente devido à cobertura vacinal inadequada. Essa doença apresenta uma manifestação oral patognomônica conhecida como:
- (A) estrias de Wickham
  - (B) molares de Moon
  - (C) manchas de Koplik
  - (D) sinal de Forchheimer
12. Dentre as alterações da língua, a que mais comumente está relacionada com a *Candida albicans* é:
- (A) glossite romboidal mediana
  - (B) língua geográfica
  - (C) língua fissurada
  - (D) glossite migratória benigna
13. O processamento de artigos para uso odontológico através da esterilização consiste em importante etapa na prática profissional. Em relação à esterilização, pode-se afirmar que:
- (A) em estufa, o processo de esterilização se dá através de radiação UV (ultravioleta) e calor seco
  - (B) em autoclave, o processo de esterilização se dá através de calor úmido e alta pressão
  - (C) em estufa, o material estará estéril após 30 minutos exposto à temperatura de 160°C
  - (D) em autoclave, o processo de esterilização se dá através de calor úmido e baixa pressão
14. Socransky descreveu complexos microbianos associados às infecções periodontais. Os microrganismos que fazem parte do complexo vermelho são:
- (A) *P. gingivalis*, *T. forsythia* e *T. denticola*
  - (B) *A. actinomycetemcomitans*, *E. corrodens* e *P. intermedia*
  - (C) *E. corrodens*, *P. intermedia* e *T. forsythia*
  - (D) *S. mutans*, *S. sanguinis* e *S. oralis*
15. Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, compareceu à Clínica de Família com queixa de "gingiva inchada". Na anamnese, relatou o uso de alguns medicamentos e a principal suspeita diagnóstica do cirurgião-dentista foi de hiperplasia gengival medicamentosa. Dentre os medicamentos associados a essa alteração pode-se citar:
- (A) nifedipina e ácido acetilsalicílico
  - (B) fenitoína e levotiroxina sódica
  - (C) ciclosporina e fenitoína
  - (D) ciclosporina e amoxicilina
16. Paciente compareceu à Clínica de Família para a realização de exodontias. A auxiliar de saúde bucal separou os fórceps 17 e 69 e os colocou na bandeja cirúrgica. Os elementos dentários a serem extraídos com esses instrumentais são respectivamente:
- (A) raiz residual do elemento dentário 44 e elemento dentário 16
  - (B) elemento dentário 46 e raiz residual do elemento dentário 42
  - (C) raiz residual do elemento dentário 43 e elemento dentário 15
  - (D) elemento dentário 36 e raiz residual do elemento dentário 22
17. As luxações são um tipo de traumatismo dentário que compreendem dano aos dentes e aos tecidos periodontais. A injúria por luxação que implica em sensibilidade à percussão, mobilidade aumentada, sem deslocamento, é a:
- (A) concussão
  - (B) subluxação
  - (C) luxação intrusiva
  - (D) luxação extrusiva
18. A gengivite ulcerativa necrotizante aguda (GUNA) é uma doença de rápida evolução, que provoca a necrose dos tecidos periodontais de proteção do dente, especialmente a papila, ocasionando muita dor ao paciente. Em função da microbiota envolvida, quando ocorre comprometimento sistêmico, o antibiótico de primeira escolha indicado é:
- (A) tetraciclina
  - (B) amoxicilina
  - (C) metronidazol
  - (D) azitromicina
19. Em relação às doenças da polpa e periápice, pode-se afirmar que:
- (A) na pulpíte irreversível, quando se remove o agente que desencadeou a alteração pulpar, o processo inflamatório cessa
  - (B) em casos de necrose pulpar o tratamento mais indicado é a pulpotomia
  - (C) a principal agressão a tecidos pulpares e perradiculares é a agressão de origem física
  - (D) os vasos sanguíneos da polpa se dilatam em resposta à cárie e esse quadro é conhecido histologicamente como hiperemia

20. Paciente do sexo masculino, 52 anos de idade, compareceu à Clínica de Família para a realização de tratamento odontológico. Na anamnese, relatou o uso de alguns medicamentos de uso contínuo e, no exame clínico, o cirurgião dentista evidenciou a necessidade da realização de exodontias. Para a realização dos procedimentos cirúrgicos um medicamento deverá ser suspenso, por interferir diretamente na coagulação sanguínea. O medicamento referido é a:
- (A) amiodarona
  - (B) varfarina
  - (C) nifedipina
  - (D) amoxicilina
21. A Lei nº 8.080/90, em seu artigo 3º, considera como fatores determinantes e condicionantes da saúde:
- (A) filiação política, atividade física e meio ambiente
  - (B) lazer, intervenção militar e renda
  - (C) educação, transporte e trabalho
  - (D) moradia, saneamento básico e segurança pública
22. A rede municipal de saúde bucal do Rio de Janeiro conta atualmente com 18 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), unidades de saúde que representam a atenção secundária na saúde bucal, com a oferta de atendimento odontológico especializado. Uma das especialidades mínimas obrigatórias dos CEOs é a:
- (A) odontopediatria
  - (B) odontogeriatria
  - (C) endodontia
  - (D) dentística
23. De acordo com o Guia de Recomendações para o Uso de Fluoretos no Brasil, publicado pelo Ministério da Saúde, em relação aos meios de utilização do flúor é correto afirmar que:
- (A) a concentração de NaF nos enxaguatórios bucais de uso semanal é de 0,2%, enquanto que os de uso diário possuem a concentração de 0,05%
  - (B) os dentifrícios devem apresentar a concentração máxima de 150 ppm de flúor, de acordo com as normas que regulam o tema
  - (C) a fluoretação das águas de abastecimento público ainda possui pouca comprovação científica, fato que restringe o seu uso em saúde pública
  - (D) a utilização do gel de flúor fosfato acidulado (FFA), que possui a concentração de 1,23%, deve ser realizada mensalmente em crianças
24. A doença falciforme é uma das enfermidades genéticas e hereditárias mais comuns no mundo, causada pela mutação no gene que produz a hemoglobina A, originando outra mutante, a hemoglobina S, uma herança recessiva. Em relação à doença falciforme:
- (A) a mutação que configura esta patologia teve origem no norte do continente europeu e acomete majoritariamente a população branca de origem nórdica
  - (B) a osteomielite é rara em pacientes com doença falciforme, especialmente quando comparamos com a frequência de casos no restante da população
  - (C) o profissional de odontologia precisa registrar os dados específicos das pessoas com doença falciforme, mas deve desconsiderar o contato com outros profissionais de saúde
  - (D) os achados clínicos bucais mais comuns são palidez da mucosa oral e língua lisa, descorada e despapilada, resultante da anemia crônica ou icterícia causada pela hemólise
25. Segundo Starfield (2002), o correto entendimento do conceito da Atenção Primária ou Atenção Básica pode ser possível a partir do conhecimento de seus princípios orientadores, que são:
- (A) a centralização político administrativa, a equidade, o vínculo e a epidemiologia
  - (B) a igualdade, a descentralização na família, a competência cultural e a longevidade
  - (C) o primeiro contato, a longitudinalidade, a abrangência e a coordenação
  - (D) a acessibilidade, a divisão territorial, a humanização e a autonomia do profissional de saúde
26. Quanto à organização da atenção em saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 17, do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:
- (A) o primeiro trimestre gestacional é um momento em que há maior risco de síncope, hipertensão e anemia para a paciente, fato que gera desconforto na cadeira odontológica
  - (B) o envolvimento familiar ou de cuidadores e a interação multidisciplinar com a equipe de saúde fazem parte do processo de atenção em saúde bucal do paciente idoso
  - (C) a limpeza da cavidade bucal dos bebês deve ser iniciada a partir da erupção do primeiro dente decíduo, com a utilização de dentifrício fluoretado e supervisão dos responsáveis
  - (D) o paciente adulto portador de HIV, na rotina do cuidado odontológico, deve ser imediatamente encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas de referência
27. Em relação aos resultados obtidos para o Município do Rio de Janeiro no Projeto SBBrazil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, a média dos índices ceo-d para a idade de 5 anos e CPO-D para o grupo etário de 35 a 44 anos foi, respectivamente, de:
- (A) 1,14 e 15,45
  - (B) 1,40 e 3,04
  - (C) 1,14 e 27,60
  - (D) 1,40 e 27,60
28. Em 2004, o Ministério da Saúde elaborou as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal para a reorganização da atenção à saúde bucal, em todos os níveis de atenção, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a referida política, pode-se afirmar que:
- (A) a atenção especializada passa a ser considerada como principal estratégia na reorganização da atenção, com a criação dos Centros de Especialidades Odontológicas
  - (B) os fluxos de atendimento ao usuário são estabelecidos, para que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, centradas principalmente no olhar clínico e biológico
  - (C) a população que não possui plano de saúde privado tem prioridade absoluta no cuidado em saúde, favorecendo populações específicas no país
  - (D) a produção do cuidado, eixo de reorientação do modelo de atenção, traz consigo a proposta de humanização do processo de desenvolver ações e serviços de saúde

29. Em relação ao Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), a alternativa correta é:
- o alto custo financeiro, o desconforto do paciente e a sensibilidade pós operatória desafiam o gestor na utilização do TRA no serviço público
  - o TRA é contra indicado para a população idosa, pois aumenta a ansiedade do paciente
  - o cimento de hidróxido de cálcio é o material de escolha para realização do TRA, em razão do benefício da liberação de flúor na cavidade bucal
  - o TRA é baseado na filosofia preventiva minimamente invasiva da estrutura dentária
30. Paciente de 36 anos de idade, sexo masculino, compareceu para atendimento odontológico na Clínica da Família. Durante a anamnese, ele relatou ser diabético. Em relação à atenção em saúde bucal do paciente adulto e diabético, é correto afirmar que:
- o desenvolvimento gradual de fadiga, emagrecimento, febre vespertina baixa, sudorese noturna excessiva e inapetência são sinais e sintomas do paciente diabético controlado
  - pacientes diabéticos não controlados frequentemente apresentam xerostomia, sensibilidade dolorosa na língua e distúrbios de gustação
  - o tratamento odontológico do diabético deve ser evitado, pois as infecções agudas e condições inflamatórias podem aumentar a taxa de glicose
  - intervenções cirúrgicas devem ser realizadas normalmente, independente do paciente estar sob monitorização e controle da glicemia
31. Na organização de um evento para realização de TRA em unidade escolar da rede pública municipal, a equipe de saúde da Atenção Primária deve:
- realizar o TRA em todas as crianças, uma vez que o local foi escolhido pela necessidade global dos alunos
  - considerar a necessidade de um Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) para assistir cada grupo de sete cirurgiões-dentistas durante a realização do TRA
  - selecionar previamente colheres de dentina de diferentes números para cavidades de tamanhos distintos
  - utilizar um local de uso compartilhado entre a equipe de saúde e os funcionários da unidade escolar no dia do evento
32. Em relação ao tratamento odontológico de paciente com doença falciforme, afirma-se que:
- a utilização de anestesia geral é preferível, pois possui menor potencial de diminuir a oxigenação do sangue e risco mais baixo que a anestesia local
  - as consultas ambulatoriais devem ser de longa duração, a fim de otimizar o tempo clínico e evitar o retorno constante do paciente
  - o tratamento dentário de urgência em pessoas com doença falciforme deve ser realizado em períodos sem crises, exigindo planejamento cuidadoso
  - em procedimentos odontológicos invasivos, sugere-se utilização de antibiótico profilático, a fim de evitar crises falcêmicas desencadeadas por infecções
33. A Estratégia de Saúde da Família é o principal método da Atenção Primária no país atualmente. Em relação às suas características, é correto afirmar que:
- seu funcionamento está baseado na demanda espontânea
  - o planejamento desconsidera o perfil epidemiológico da população
  - o modelo é centrado na atenção integral à saúde
  - os serviços de saúde ficam concentrados nos centros urbanos dos municípios
34. Paciente do sexo masculino, 31 anos de idade, casado e pai de dois filhos, apresentou-se para consulta odontológica inicial na unidade de Atenção Primária. Na anamnese, relatou sudorese noturna, fadiga crônica, diarreia, emagrecimento não compatível com atividade física ou dieta, febre persistente e xerostomia. No exame clínico odontológico foi constatado que ele apresenta leucoplasia pilosa e candidíase de repetição. Considerando o quadro em questão, o profissional deverá suspeitar de:
- tuberculose
  - HIV/AIDS
  - sífilis
  - HPV
- Considerando a Nota Técnica: Organização do Acesso na Saúde Bucal, elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, responda às questões 35 e 36.**
35. Além do objetivo de definir regras aplicáveis à organização do acesso na saúde bucal e alinhar o trabalho da saúde bucal ao conjunto de regras e diretrizes da Atenção Primária à Saúde, está proposto na Nota Técnica que:
- todo usuário que chegar à Unidade de Atenção Primária à Saúde com uma demanda de cuidado em saúde bucal deve ser agendado para a semana seguinte, a fim de ser escutado e avaliado no consultório odontológico
  - recomenda-se disponibilizar um número de vagas para que o Agente Comunitário de Saúde (ACS) defina isoladamente prioridades para o atendimento em Saúde Bucal, posto tratar-se de uma decisão técnica
  - em casos de urgência odontológica, os pacientes que não pertencem ao território de responsabilidade da unidade de saúde devem receber o primeiro atendimento e somente depois serem redirecionados para sua unidade de referência
  - as atividades de escovação dental supervisionada, realizadas no escovário da unidade de saúde, deverão ser precedidas das atividades assistenciais clínicas
36. Em relação à organização do processo de trabalho das equipes de saúde bucal, é correto afirmar que:
- na falta de pacientes agendados e na ausência de demanda espontânea, a equipe de saúde bucal poderá realizar busca ativa na unidade para o preenchimento imediato dessas consultas
  - o grupo de Promoção da Saúde tem a função primordial de organizar o acesso, pois é a única porta de acesso e uma etapa condicional para a consulta odontológica
  - o usuário que faltar a duas consultas odontológicas, consecutivas ou não, estará automaticamente desligado do programa de atendimento odontológico e retornará ao final da fila de espera
  - a equipe de saúde bucal deve ter uma lista de espera de pacientes aguardando consulta, orientada pela ordem de procura ao serviço odontológico

37. Sobre os princípios norteadores das ações propostas nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Ministério da Saúde – 2004), a alternativa correta é:
- (A) gestão participativa - os gestores decidem isoladamente a política de saúde bucal
  - (B) acolhimento - desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade biopsicossocial
  - (C) responsabilidade profissional - cumprir horários e estabelecer padrões centrados na prática profissional
  - (D) intersetorialidade - organizar o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos
38. Sobre a organização da atenção em saúde bucal por meio do ciclo de vida do indivíduo, o Caderno de Atenção Básica nº 17, do Ministério da Saúde, preconiza que:
- (A) o ferro e o magnésio merecem atenção especial na adolescência, em função do aumento da massa óssea e do rápido crescimento muscular, respectivamente
  - (B) a extração precoce dos dentes decíduos deve ser evitada, pois este procedimento pode alterar o tempo de erupção do dente permanente, podendo provocar má oclusão
  - (C) os idosos portadores de prótese total necessitam de acompanhamento da equipe de saúde bucal a cada três anos
  - (D) as exodontias ou cirurgias são contra indicadas em pacientes gestantes
39. No ano de 2011, o Ministério da Saúde concluiu o quarto levantamento epidemiológico, de âmbito nacional na área de Saúde Bucal, intitulado SBBrasil 2010 - Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Com relação ao método utilizado no SBBrasil 2010:
- (A) cada equipe de campo era formada por um examinador, um anotador, um auxiliar de serviços gerais, um motorista e um mestre em saúde pública
  - (B) a pesquisa foi do tipo censitário, com a avaliação da saúde bucal de toda a população brasileira
  - (C) a prevalência, extensão e gravidade da doença periodontal foram avaliadas para as idades de 5 e 12 anos
  - (D) a prevalência e gravidade da fluorose dentária foram avaliadas na população de 12 anos de idade
40. Sobre a atenção em saúde bucal de pessoas com deficiência, observa-se que:
- (A) a aplicação tópica de flúor e o TRA são procedimentos importantes nos tratamentos odontológicos para estes usuários
  - (B) os problemas bucais são pouco frequentes nas pessoas com deficiência
  - (C) os pacientes com síndrome de Down devem receber atendimento apenas nos CEOs
  - (D) os serviços de saúde devem esperar pela demanda espontânea de atendimento odontológico para pessoas com deficiência