



PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Modalidade Demais Estágios: **ODONTOLOGIA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)**

1. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, considerando, inclusive, a marcação do cartão-resposta.
2. A prova objetiva deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, fabricada em material incolor e transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha.
3. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, de **conteúdo específico**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D).
4. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no cartão-resposta, com caligrafia usual, para posterior exame grafológico:

"A fé é como o amor: não pode ser obtida pela força."

5. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.**
6. O telefone celular desligado e demais pertences não permitidos deverão permanecer acondicionados em saco de segurança devidamente lacrado, desde o momento da entrada na sala de prova até a saída do candidato do estabelecimento de realização da mesma.
7. Será vedado ao candidato, dentro da sala de realização da prova, independente do início da prova:
 - a) o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc., salvo se autorizado, previamente, pela Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no Edital Regulamentador do certame;
 - b) o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos;
 - c) a consulta a qualquer material (legislação, livros, impressos, anotações, jornal e revista);
 - d) o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais, permanecendo sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
9. A simples posse ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, mesmo que desligado, no local da prova, corredor ou banheiros, implicará a exclusão do candidato no certame.
10. Não será permitido ao candidato fumar, conforme determinado no art. 49 da Lei Federal nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
11. Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, poderá entregar o **cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita** e retirar-se do recinto levando o seu caderno de questões.
12. Não será permitida, em hipótese alguma, a cópia das marcações efetuadas no cartão-resposta.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
14. Não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado a prova.
15. O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.
16. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio, no segundo dia útil após a realização da prova, estando disponível, também, no site <http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos>.

ODONTOLOGIA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)

01. Na leucometria diferencial, quando aumentados, são indicativos de infecções bacterianas os:
- (A) linfócitos
 - (B) eosinófilos
 - (C) basófilos
 - (D) neutrófilos
02. Em um coagulograma, os testes em que são avaliados os fatores da via intrínseca e extrínseca são, respectivamente:
- (A) tempo de protrombina e tempo de tromboplastia parcial
 - (B) tempo de tromboplastia parcial e tempo de protrombina
 - (C) tempo de sangramento e tempo de tromboplastia parcial
 - (D) tempo de tromboplastia parcial e tempo de sangramento
03. No tratamento de pacientes asmáticos, por estarem frequentemente associados a precipitações de ataques de asma, deve-se evitar o uso de:
- (A) anti-inflamatórios não estereoidais
 - (B) benzodiazepínicos
 - (C) catecolaminas simpaticomiméticas
 - (D) quinolonas
04. A incisão planejada para evitar a gengiva inserida marginal, utilizada quando se trabalha no ápice da raiz dentária é a:
- (A) em Y
 - (B) semilunar
 - (C) em L
 - (D) quadrangular
05. O tipo de sutura que mantém as duas papilas em posição e faz um cruzamento sobre o alvéolo que ajuda a manter o coágulo é chamado de:
- (A) em colchoeiro horizontal
 - (B) em colchoeiro vertical
 - (C) em oito
 - (D) em barra grega
06. Na adaptação do fórceps ao dente, para que haja maior eficácia na dilatação das paredes do alvéolo e menor probabilidade de fratura radicular, o fulcro da força deve ser deslocado na direção:
- (A) vestibulo lingual
 - (B) apical
 - (C) inciso vestibular
 - (D) oclusal
07. Com relação à profundidade, quando a porção mais superior do terceiro molar inferior está entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar, ele está em posição ou classe:
- (A) I
 - (B) II
 - (C) A
 - (D) B
08. Pacientes com alto risco para endocardite infecciosa devem evitar:
- (A) bloqueio anestésico do nervo alveolar inferior
 - (B) tomadas de radiografias intrabucais
 - (C) colocação ou ajuste de aparelhos protéticos ou ortodônticos
 - (D) a utilização de piercings bucais
09. Na remoção de um molar inferior, o sentido da incisão posterior no ramo ascendente mandibular acompanha a angulação divergente do ramo. Incisões mal executadas, geralmente fora de apoio ósseo, levam a injúrias aos tecidos moles e riscos ao nervo:
- (A) mandibular
 - (B) bucal
 - (C) lingual
 - (D) goniano
10. Na cirurgia para a remoção de dente ou raiz deslocada para o interior do seio maxilar, o acesso usual é o:
- (A) em L
 - (B) de Caldwell-Luc
 - (C) em Y
 - (D) de Donati
11. Como um fato que geralmente indica menor dificuldade na remoção de um terceiro molar pode-se citar:
- (A) raízes fusionadas
 - (B) maior densidade do osso circunjacente
 - (C) saco folicular reduzido ou inexistente
 - (D) contato direto com o segundo molar adjacente
12. Pacientes em uso do anticoagulante varfarina podem usar, sem risco, o antibiótico:
- (A) azitromicina
 - (B) metronidazol
 - (C) amoxicilina
 - (D) ciprofloxacina
13. Para remover um resto radicular intraósseo quando o osso da crista vestibular precisa ser mantido, é preferível utilizar a técnica:
- (A) da roda e eixo
 - (B) de cunha ou calçadeira pela palatina
 - (C) de alavanca de primeira classe
 - (D) da janela aberta
14. É um sintoma da fratura de arco zigomático:
- (A) oftalmoplegia
 - (B) trismo
 - (C) enoftalmia
 - (D) desoclusão
15. A azitromicina possui espectro de ação similar ao das penicilinas e ainda ação contra:
- (A) cocos Gram-negativos
 - (B) cocos Gram-positivos
 - (C) bacilos anaeróbios Gram-negativos
 - (D) bactérias produtoras de betalactamases

16. Uma celulite facial tem como característica:
- (A) dor difusa e bordas difusas
 - (B) centro brilhante e amolecido
 - (C) progressão decrescente
 - (D) pus presente
17. O espaço fascial, que quando comprometido por infecção tem como características causar dificuldade de deglutir, desvio de via aérea, progressão cervical rápida, além de possível trombose de veia jugular interna, erosão de artéria carótida interna ou de seus ramos e interferência nos nervos cranianos IX, X e XII, é o:
- (A) pterigomandibular
 - (B) submandibular
 - (C) laterofaríngeo
 - (D) sublingual
18. Em um trauma de face que ocorra lesão do complexo naso órbita etmoidal, resultando no deslocamento dos ligamentos cantais mediais, é esperado:
- (A) distopia
 - (B) diplopia binocular
 - (C) oftalmoplegia
 - (D) telecanto traumático
19. Quanto à ação do agente etiológico, uma fratura é considerada indireta ou por contragolpe quando:
- (A) os tecidos vizinhos continuam intactos
 - (B) a fratura ocorre um pouco distante do trauma
 - (C) os fragmentos ósseos não sofrem cavalgamento com força muscular
 - (D) interessa somente uma porção do osso
20. O efeito colateral mais comum no uso de benzodiazepínicos é a:
- (A) diminuição do fluxo salivar
 - (B) sonolência
 - (C) excitação, agitação e irritabilidade
 - (D) visão dupla
21. O sinal vital que menos varia com a infecção é a:
- (A) pressão sanguínea
 - (B) taxa de pulso
 - (C) taxa respiratória
 - (D) temperatura axilar
22. No pós-operatório de um retalho muco periosteal, a principal causa de deiscência ou separação das margens da ferida é:
- (A) realização de sutura simples, quando a indicada seria em colchoeiro
 - (B) higiene deficiente por parte do paciente
 - (C) a ausência de adequado osso de sustentação
 - (D) cirurgia muito traumática
23. O nível sanguíneo de lidocaína em microgramas por mililitro, capaz de causar depressão respiratória, apneia, vasodilatação periférica severa e parada cardíaca é:
- (A) abaixo de 4,0
 - (B) de 4,5 a 7,0
 - (C) de 7,0 a 9,5
 - (D) acima de 10,0
24. A droga que deve ser usada na eventualidade de uma crise alérgica grave e que deve fazer parte do arsenal de emergência à disposição do cirurgião-dentista é:
- (A) dipirona
 - (B) adrenalina
 - (C) diazepam
 - (D) ibuprofeno
25. O medicamento que necessita de receita de controle especial para a sua comercialização é:
- (A) captopril
 - (B) cetorolaco
 - (C) tramadol
 - (D) piroxicam
26. A interação medicamentosa que ocorre quando fármacos administrados em conjunto produzem uma resposta exagerada, maior que a conseguida com o uso isolado dos mesmos medicamentos, em máxima dose efetiva, é:
- (A) sinergismo
 - (B) somação
 - (C) antagonismo
 - (D) idiosincrasia
27. A técnica anestésica conhecida como Vazirani-Akinosi é descrita como:
- (A) bloqueio do nervo maxilar de boca fechada
 - (B) infiltração subperiosteal
 - (C) infiltração intramuscular
 - (D) bloqueio do nervo mandibular de boca fechada
28. Um paciente saudável, de 60kg, precisa receber anestesia local para exodontia do 36. Considerando que o anestésico usado será lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, a quantidade máxima de tubetes que poderá ser utilizada é de:
- (A) 5
 - (B) 6
 - (C) 7
 - (D) 8
29. Nos pacientes vítimas de fratura do assoalho orbitário, um dos sintomas a ser investigado é a incapacidade de rotacionar o olho do lado afetado. Tal sintoma é causado por:
- (A) dor local
 - (B) ruptura muscular
 - (C) edema local
 - (D) encarceramento muscular
30. Diante de uma laceração no lábio, que envolva pele e mucosa, a sutura do plano superficial deverá ser iniciada na:
- (A) junção mucocutânea
 - (B) metade da ferida
 - (C) mucosa
 - (D) pele perioral
31. A ferida causada pela fricção entre um objeto e a superfície do tecido mole é:
- (A) contusão
 - (B) abrasão
 - (C) laceração
 - (D) incisão

32. Existem três pilares bilateralmente, formando o suporte primário vertical da face. Esses pilares são:
- (A) nasomaxilar, zigomático e pterigomaxilar
 - (B) frontal, zigomático e mandibular
 - (C) nasomaxilar, zigomático e mandibular
 - (D) frontal, maxilar e mandibular
33. Em caso de ferida facial por mordedura de animais, está indicado o uso do seguinte esquema antibiótico, por cinco dias:
- (A) doxiciclina 20 a 40 mg/kg/dia
 - (B) sulfametoxazol com trimetoprima 10 a 30 mg/kg/dia
 - (C) amoxicilina com clavulanato 20 a 40 mg/kg/dia
 - (D) clindamicina 10 a 20 mg/kg/dia
34. Em pacientes não vacinados para o tétano, são consideradas feridas com grande risco, para as quais deve ser seguido o protocolo rígido de profilaxia as:
- (A) contusões
 - (B) abrasões
 - (C) fraturas expostas
 - (D) fraturas fechadas
35. São equipamentos de proteção individual (EPI) que devem ser usados por todos os membros da equipe, inclusive pelo paciente:
- (A) campo estéril
 - (B) propés
 - (C) luvas
 - (D) óculos de proteção
36. Uma infecção odontogênica grave pode disseminar por via ascendente, causando:
- (A) mediastinite
 - (B) celulite
 - (C) abscesso cerebral
 - (D) angina de Ludwig
37. Diante de uma infecção odontogênica, alguns sintomas podem indicar necessidade de avaliação especializada. Um desses sintomas é:
- (A) trismo acentuado
 - (B) presença de pus
 - (C) dor intensa
 - (D) mobilidade dentária
38. São considerados sinais de fratura zigomático-orbitária:
- (A) diplopia e desocclusão
 - (B) edema, enoftalmia e distopia
 - (C) distopia, enoftalmia e diplopia
 - (D) edema e hematoma
39. Um canino superior, caso esteja envolvido em uma infecção odontogênica, poderá acometer o espaço:
- (A) bucal
 - (B) infraorbitário
 - (C) infratemporal
 - (D) submassetérico
40. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se norteia pelos seguintes princípios doutrinários:
- (A) universalidade, equidade e integralidade
 - (B) descentralização, regionalização e hierarquização
 - (C) universalidade, equidade e participação social
 - (D) descentralização, integralidade e equidade