

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – GESTANTE

Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose Indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT) (inativadas)	Com 3 doses de Penta/DTP/ dT/dTpa	1 reforço de dTpa adulto, em cada gestação (20ª-36ª semanas)		
	Com menos de 3 doses de Penta/ DTP/dT/dTpa	Completar o esquema com pelo menos 1 dose de dTpa adulto a partir da 20ª semana de gestação ³ e as demais doses com dT (Dupla adulto)		
	Não vacinada	1ª e 2ª doses com dT e 3ª dose com dTpa adulto (20ª-36ª semanas), quando captada precocemente	a. A 2ª dose ou reforço, deve ser feita, preferencialmente, até 20 dias antes do parto ¹ . b. Agendar dose de reforço dTpa adulto, a cada nova gestação	DE
		1ª dose de dTpa adulto (20ª-36ª semanas) e as demais com dT, quando captada mais tarde		
Hepatite B (recombinante) DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	-	-
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		
	Não vacinada	3 doses (0,1,6)	Sem limite de idade	DD
Febre Amarela (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela	Não vacinada	Não vacinar. Realizar dose única SOMENTE em situação de risco epidemiológico	Durante o período gestacional	DE
	Vacinada com 1 ou + doses	Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada		

Vacina Influenza: está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

³. A DTPa adulto deve ser administrada idealmente entre a 20ª-36ª semana de gestação. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais precoce possível até 45 dias pós-parto.