

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – GESTANTE

Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose Indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
dTpa tipo adulto / Dupla adulto (dT) (inativadas) DOENÇAS EVITADAS: Difteria, Tétano (acidental, neonatal) e Coqueluche	Com 3 doses de Penta/DTP/ dT/dTpa	1 reforço de dTpa adulto, em cada gestação (20 ^a -36 ^a semanas)	a. A 2 ^a dose ou reforço, deve ser feita, preferencialmente, até 20 dias antes do parto ¹ . b. Agendar dose de reforço dTpa adulto, a cada nova gestação	DE
	Com menos de 3 doses de Penta/ DTP/dT/dTpa	Completar o esquema com pelo menos 1 dose de dTpa adulto a partir da 20 ^a semana de gestação ³ e as demais doses com dT (Dupla aduto)		
	Não vacinada	1 ^a e 2 ^a doses com dT e 3 ^a dose com dTpa adulto (20 ^a -36 ^a semanas), quando captada precocemente		
		1 ^a dose de dTpa adulto (20 ^a -36 ^a semanas) e as demais com dT, quando captada mais tardiamente		
Hepatite B (recombinante) DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	-	-
	Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2 ^a ou 3 ^a dose	Sem limite de idade	DD
	Não vacinada	3 doses (0,1,6)		
Febre Amarela (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela	Não vacinada	Não vacinar. Realizar dose única SOMENTE em situação de risco epidemiológico	Durante o período gestacional	DE
	Vacinada com 1 ou + doses	Não administrar nenhuma dose. Considerar vacinada		

Vacina Influenza: está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

³. A DTPa adulto deve ser administrada idealmente entre a 20^a-36^a semana de gestação. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa adulto, aplicar no puerpério o mais precoce possível até 45 dias pós-parto.

Fonte: CPI/SVS/SUBPAV/SMS-Rio baseado no Calendário Nacional de Vacinação da CGPNI/MS / Portaria GM/MS nº 1533/2016 NI nº 384/2016 | Atualizado em 05/06/2020 | Arte Ascom – SMS