

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – ADOLESCENTE

Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação	
10 a 19 anos	<b>Hepatite B</b> (recombinante) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	Sem limite de idade	-	
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		DD	
		Não vacinado	3 doses (0,1 e 6m)			
	<b>Febre Amarela</b> (atenuada) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Febre amarela	Não vacinado	Dose única	Realizada(s) a partir de 5 anos de idade: não há dose adicional  Com 1 dose antes dos 5 anos de idade: reforço	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário de adolescentes)	DE
		Com 1 ou mais doses				
	<b>HPV quadrivalente<sup>1</sup></b> (inativada): <b>meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos</b> <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Câncer de cólo de útero e Câncer da região genital masculina	Com 2 doses	Não há dose adicional	Completar o esquema com 2ª dose	1ª dose: até 14 anos, 11 meses e 29 dias 2ª dose: sem limite de idade	DD
		Com 1 dose				
		Não vacinado(a)	2 doses (0-6m)			
	<b>Dupla adulto</b> (inativada) (toxoide) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Difteria e Tétano	Com 3 doses de Penta/DTP/dT	Reforço, se última dose ≥10 anos	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose	Sem limite de idade. 1 Reforço de 10 em 10 anos	DE
		Com menos de 3 doses				
		Não vacinado	3 doses (0, 2 e 4m)			
	<b>Meningocócica ACWY</b> (inativada, conjugada) <b>meninos e meninas de 11 e 12 anos</b> <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Doença invasiva causada por <i>Neisseria meningitidis</i> dos grupos A, C, W 135 e Y	-	Dose única		até 12 anos, 11 meses e 29 dias	DE
	<b>Tríplice viral - SCR</b> (atenuada) <b>DOENÇAS EVITADAS:</b> Sarampo, Caxumba e Rubéola	Com 2 doses feitas na infância	Não há dose adicional	2ª dose	-	-
Com 1 dose						
Não vacinado		2 doses (0,1m)	Até 19 anos, 11 meses e 29 dias (calendário de adolescentes)			

**Vacina Influenza:** está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

1. A vacina HPV está indicada em 3 doses (esquema 0, 2 e 6) para quem vive com HIV e imunodeprimidos na faixa etária de 09 a 26 anos de idade, necessitando de prescrição médica para ser vacinado.