

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO – ADULTO

Idade	Vacina	História vacinal	Esquema/ Dose indicada	Idade máxima para início do esquema	Local de aplicação
20 ou mais	Hepatite B (recombinante) DOENÇAS EVITADAS: Hepatite B	Com 3 doses	Não há reforço	—	—
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose	Sem limite de idade	DD
		Não vacinado	3 doses (0, 1 e 6m)		
	Febre Amarela (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Febre amarela	Não vacinado	Dose única	Até 59 anos, 11 meses e 29 dias Acima desta idade avaliar situação epidemiológica	DE
		Com 1 ou mais doses	Realizada(s) a partir de 5 anos de idade: não há dose adicional		
			Com 1 dose antes dos 5 anos de idade: reforço		
	Dupla adulto (inativada) (toxóide) DOENÇAS EVITADAS: Difteria e Tétano	com 3 doses de Penta/ DTP/dT anteriormente	Reforço, se última dose ≥ 10 anos	Aplicar Reforço de 10 em 10 anos, sem limite de idade	DE
		Com menos de 3 doses	Completar o esquema com 2ª ou 3ª dose		
		Não vacinado	3 doses (0, 2 e 4m)		
	Tríplice viral - SCR² (atenuada) ou Dupla Viral (atenuada) DOENÇAS EVITADAS: Sarampo, Caxumba e Rubéola	Com 2 doses SCR	Não há dose adicional	Até 29 anos, 11 meses e 29 dias	DD
		Com 1 dose na Infância	2ª dose		
		Não vacinado	2 doses (0,1m)	Até 59 anos, 11 meses e 29 dias Acima desta idade avaliar situação epidemiológica	
		Não vacinado de 30 a 59 anos	Dose única		
60 ou mais	Pneumocócia 23 valente (inativada) para indivíduos asilados , anualmente, no período de campanha de vacinação DOENÇAS EVITADAS: Pneumonias, Meningites e outras doenças causadas por 23 tipos de pneumococo	Com 2 doses	Não há dose adicional	—	DE
		1 dose com 5 anos ou mais	1 único reforço	—	
		Não vacinado	1ª dose	1 único reforço após 5 anos da 1ª dose	

Vacina Influenza: está disponível anualmente em períodos de campanha, conforme grupos recomendados pelo Ministério da Saúde.

2. Para profissionais de saúde, independentemente da idade: administrar 2 doses de SCR, conforme situação vacinal anterior, com intervalo mínimo de 30 dias.